




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Testar o inalador

Antes de usar o inalador pela primeira vez, certificar-se que funciona. Retirar a tampa do aplicador bucal, pressionando ligeiramente os lados. Para se certificar que funciona pela primeira vez, agitar bem, direcionar o aplicador bucal para longe pressionar o recipiente metálico para que liberte duas doses no ar. Se o inalador não for usado durante cinco dias ou mais, agitar bem e libertar duas doses no ar, para certificar que funciona.


Utilizar o inalador

1



Retirar a tampa do aplicador bucal, pressionando ligeiramente os lados. Verificar a presença de partículas estranhas no interior e exterior do inalador, incluindo na peça bucal.

2



Agitar bem o inalador para assegurar que o conteúdo é uniformemente misturado. Segurar o inalador na posição vertical entre os dedos com o polegar sob a base, abaixo do aplicador bucal.

3



Expirar tanto quanto for confortavelmente possível,

4



e depois colocar a peça bucal na boca, entre os dentes, e cerrar os lábios à sua volta, sem morder.

5



Inspirar pela boca. Logo após iniciar a inspiração, premir o topo do inalador enquanto inspira forte e profundamente.

6



Suster a respiração durante 10 segundos ou tanto quanto lhe for confortavelmente possível, e retirar o inalador da boca.

7



Expire suavemente.

8



Recolocar a tampa na peça bucal, pressionando-a firmemente e ajustando-a ao lugar.